

# DOXI-TYLO C

Water Soluble Powder



**LOW COST & HIGHLY EFFECTIVE**



# DOXI-TYLO C

Water Soluble Powder

ڈوکسی۔ ٹائلو سی

اجزائے ترکیبی:

**Composition:**

Each 1000 Gram Contains:-

Tylosin Tartrate (B.P).....100gm  
Doxycycline HCL (B.P).....200gm  
Colistin Sulphate (B.P).....500miu  
Product Complies with Baariq Specs.

**Indications:**

DOXI-TYLO C powder is indicated for the treatment and prevention of CRD, CCRD, Fowl Cholera, Fowl Typhoid. Infections Coryza, Bacterial Enteritis. Early chick mortality and other Respiratory tract infections in large animals infection caused by Tylosin Tartrate Doxyxcline and Colistin Sulphate sensitive organisms.

**Dosage and Administrations:**

**Poultry:**

**Treatment :** 1gm powder per 2 Liter of drinking water for 3-5 days.

**Prevention:** 1gm powder per 4 Liter drinking water 3-5 days.

**Cattle (calves).**

100gm per 80 calves of 50 kg body weight for 3-5 days.

**For Better result use medicine as per recommended dose**

**Precautions:**

1. Store in a cool and dry place.
2. Keep away from the reach of children.



**BAARIO**  
**PHARMACEUTICALS**

Manufacturer & Exporter Of Animals Health Division

**HEAD OFFICE:**

SUIT # 105, 1st Floor, Annum Estate, 49 D.A.H.S  
Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - Pakistan.  
Tel: +92-21-34321892 Fax: +92-21-34321893  
E-mail: baariq@yahoo.com

**PLANT:**

Plot # 600, Sundar Industrial Estate, Sundar  
Raiwind Road, Lahore - Pakistan.  
Tel: +92-42-35297522-4  
E-mail: baariq@yahoo.com

صرف جانوروں کے استعمال کیلئے

For Veterinary Use Only

علامات:

مرغیوں میں سی آر ڈی، سی سی آر ڈی، ایکولاٹی،  
ٹائیفائیڈ، کالرا، سالمونیلا، اوفیلیا نیٹس کورائزہ، گرام مثبت، گرام منفی  
سٹیفلوکوکس، اور مائیکوپلازما سے پیدا شدہ بیماریوں کیلئے مفید ہے۔

خوراک و طریقہ استعمال:

پولٹری:

علاج: ایک گرام پاؤڈر فی 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک  
احتیاط: ایک گرام پاؤڈر فی 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک  
پھچڑوں میں: 100 گرام 80 پھچڑوں کیلئے بلحاظ جسمانی وزن  
50 کلوگرام فی پھچڑا، 3 سے 5 دن تک  
احتیاطیں:

1۔ دو کوئیک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔  
2۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔